

Infart i subkutan vävnad för injektion och infusion

Enhet: Länssjukvården__old

Visa huvudet

Giltigt från: 2003-01-10

Utarbetad av: Smärtmottagningen: Annelie Johansson, Bjarne Sörensen
Vårdhygien: Lena Nilsson

Fastställd av: xxx

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på webben.

Placering

Placera en mindre perifer venkateter (max 0,9mm lumen) i subkutan vävnad. Patientens perifera cirkulation avgör kateterns placering, vanligen på buk, ovanför bröstet eller på överarmen.

Inläggning

Desinfektera huden med Klorhexidinsprit (5 mg/ml). Låt lufttorka.

Fixering

- Fixera med transparent semipermeabelt förband
- Hudskydd exempelvis Cavilon kan användas under fixeringsförband på patient med känslig hud
- Notera datum, klockslag och signatur på fixeringsförbandet

Katetern kan sitta upp till 3 dagar om insticksstället/omgivande hud är retningsfritt och läckage inte förekommer. Leverantören kan ange kortare användningstid.

Inspektera minst 1 gång per dag

OBS! sätt alltid på ny steril propp om den har avlägsnats.

Dokumentation

- Fixeringsförband: datum, klockslag, signatur
 - Temperaturlista: placering, signatur
 - Omvårdnadsjournal: indikation, typ av kateter, tecken på komplikation
-