

Diagnos och åtgärds-koder, PD-mottagningen

Patient som kommer för start av CAPD (undervisning och träning)

	Text	Diagnos/åtgärds-kod
Huvuddiagnos	Peritonealdialys	Z49.2
Åtgärd	CAPD-start	DR013
Bidiagnos	Njursvikt, stadium 5	N18.5

Åtgärds-koden DR013 används under tiden från kateterinläggningen fram till 1 månad efter dialysstart.

Registrera denna kod vid varje besök under denna period.

Patient som kommer för kontroll CAPD

	Text	Diagnos/åtgärds-kod
Huvuddiagnos	Peritonealdialys	Z49.2
Åtgärd	Kontroll CAPD	DR012
Bidiagnos	Njursvikt, stadium 5	N18.5

Telefonsamtal som ersätter ett fysiskt besök ska kodas.

Koda grundsjukdomen (oftast N18.5 – Njursvikt, stadium 5)

Var god se **Rutin distanskontakt telefon och video:**

[OpenDoc.aspx \(regionkronoberg.se\)](https://regionkronoberg.se/OpenDoc.aspx)

Uppdaterat status på medicinavdelning

När en PD-patient ligger på en medicinavdelning skrivs en anteckning som kopplas till vårdtillfällets kontakt, ingen diagnos- eller åtgärds kod behöver registreras. Kodan DR024 ska vid utskrivning registreras i slutanteckningen för att tala om att patienten är beroende av peritonealdialys.

Om det sedan tidigare finns en inbokad kontakt för ett besök på PD-mottagningen flyttas detta besök fram i tiden alternativt makuleras.

Uppdaterat status på annan medicinskt ansvarig enhet

Om patienten ligger på en vårdavdelning på annan medicinskt ansvarig enhet kan inte sjuksköterska på Medicinkliniken dokumentera på vårdtillfällets kontakt. Kodan DR024 ska vid utskrivning registreras i slutanteckningen för att tala om att patienten är beroende av peritonealdialys.

1. Handlar det om ett sedan tidigare inbokad besök finns det redan en kontakt för PD-kontroll, använd den kontakten och diagnos- och åtgärds koda likt ett vanligt besök på PD-mottagningen.
2. Vid ett nyuppkommet behov av PD-kontroll då patienten ligger på annan medicinskt ansvarig enhet skrivs en anteckning utan kontaktkoppling. Diagnos- eller åtgärds kod behöver inte registreras om inte anteckningen är kopplad till en kontakt.
3. Vid inkommande konsultremiss för hjälp med PD-kontroll skapas en konsultkontakt (9. Konsult). Anteckningen kopplas till konsultkontakten och åtgärds kod DR024 ska registreras.

Åtgärder som vanligtvis inte görs på ett rutinbesök ska kodas**Exempel på åtgärder som ska kodas på PD-mottagningen**

Åtgärd	Åtgärds kod
EKG	AF022
Bladderscan	AK043
Vaccination	*DT030 + ATC-kod
Läkemedelstillförsel intramuskulärt	**DT011 + ATC-kod
Läkemedelstillförsel intravenöst	**DT016 + ATC-kod
Läkemedelstillförsel subkutan	**DT021 + ATC-kod
Dialytest PFT (mäta dialyseffektivitet)	DR012
Aggregatbyte	DR012
Ultraljud lungor	AV002

Använd aldrig en åtgärds kod utan en huvuddiagnos.

Vaccinationer

* 1. Patient som får vaccination i samband med vanligt PD-besök

	Text	Diagnos/åtgärds kod
Huvuddiagnos	Peritonealdialys	Z49.2
Åtgärd	CAPD-start/Kontroll CAPD	DR013/DR012
Bidiagnos	Njursvikt, stadium 5	N18.5
Åtgärd	Vaccination	DT030
ATC-kod		Se läkemedelslista/FASS

* 2. Patient som enbart kommer för influensa-vaccination

	Text	Diagnos/åtgärds kod
Huvuddiagnos	Vaccination avseende influensa	Z25.1
Åtgärd	Vaccination	DT030
ATC-kod		Se läkemedelslista/FASS

* 3. Patient som enbart kommer för pneumokock-vaccination

	Text	Diagnos/åtgärds kod
Huvuddiagnos	Vaccination avseende pneumokocker	Z26.8
Åtgärd	Vaccination	DT030
ATC-kod		Se läkemedelslista/FASS

Läkemedelstillförsel

**** Patient som får läkemedelstillförsel i samband med besök för PD-kontroll**

	Text	Diagnos/åtgärds kod
Huvuddiagnos	Peritonealdialys	Z49.2
Åtgärd	Kontroll CAPD/CAPD-start	DR013/DR012
Åtgärd	Läkemedelstillförsel	DT011/DT016/DT021
ATC-kod		Se läkemedelslista/FAS

Om patienten endast kommer för läkemedelstillförsel blir huvuddiagnosen för besöket den sjukdom/det symptom som är anledningen till läkemedelstillförseln.

OBS! Det finns olika koder för läkemedelstillförsel beroende på hur denna ges, var god se sidan 3.