

Till personer som handlägger patienter med klamydia i Region Kronoberg

Information om klamydiahantering vid positivt prov.

1. Patienten ska behandlas av vårdgivaren och provsvaret vidimeras av svarmottagande enhet.

Kontrollprov: Det finns ingen känd resistensutveckling för klamydia. Har patienten följt sin ordination behövs därför inget kontrollprov. Om man behöver ta ett kontrollprov bör man vänta **8 veckor** efter behandling. Tidigare prov ger ett osäkert resultat (om positivt).

2. Eventuell fast partner ska behandlas (samtidigt) efter klamydiaprovtagning. (Blir partnern positiv ska även han/hon remitteras till central smittspårningsenhet). Behandlingsrekommendation Doxyferm® (doxycyklin)
3. Smittspårningen utförs av den centrala smittspårningsenheten. Detta sker inte av sig själv utan man måste skicka remiss dit.

Remissen hittas i Cambio Cosmic

Remiss: Skicka remiss

Remisstyp: Ändra till konsultationsremiss

Välj enhet: Centrala smittspårningsenheten

Pappersremiss: Endast för de som ej har Cambio Cosmic. Skickas till Sesam, Centrala smittspårningsenheten, N Esplanaden 35, 352 31, Växjö

När smittspårningen remitterats till den centrala smittspårningsenheten så gör de den kliniska anmälan i Sminet.

4. Informera patienten att personal från centrala smittspårningsenheten kommer att ta kontakt inom 1-2 veckor. **Viktigt att kontrollera så aktuellt telefonnummer!**

Med vänlig hälsning

Enheten för smittspårning/Smittskydd Kronoberg