

## Provtagningslista för att utesluta somatisk orsak innan remiss för neuropsykiatrisk utredning:

### Provtagningslista

Dessa prover bör ha tagits för att utesluta annan somatisk orsak till neuropsykiatriska symtom innan remiss till specialistnivå har skickats.

- TSH och fritt-T4
- Blodstatus
- Glukos
- B12
- ASAT/ALAT, GT, ALP, Bilirubin, LD
- Kreatinin, Na, K och CA och Albumin

Diagnostik av neuropsykiatrisk problematik vid samtidigt skadligt bruk bör göras när individen är drogfri. Kartläggning av användning av alkohol och psykoaktiva substanser ska göras inför och under diagnostisk utredning och behandling för individer över 13 år och för yngre vid behov. Behovet av drogtest och hur ofta det bör göras ska bedömas individuellt. Hos personer med missbruksbakgrund ska godkända prover uppvisas i nära anslutning till utredning.

- CDT och ev PEth
- Drogscreening, övervakat urinprov (om positivt utfall; ställningstagande till åtgärd. Vanligen 6 veckors verifierad drogfrihet innan utredning initieras)

Eventuell komplettering:

D-vitamin, folat, ferritin och homocystein (särskilt vid selektivt ätande eller vegankost)