

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL I KOMMUNAL HEMSJUKVÅRD 2024

UTBYTBARA LÄKEMEDEL 2024

Utbytbara läkemedel på denna lista, tillsammans med de läkemedel som finns i Cosmics utbytesfunktion, är de läkemedel som sjukvårdens i Region Kronoberg. Listan omfattar fler utbyten än de som LäkeMedelsverket anger som utbytbara, men där utbyte ändå bedöms kunna göras patientsäkert inom slutenvården.

LÄKEMEDEL	SYNONYM
Abasaglar	Lanus
Abenor Depot	Depakine retard, Ergenyl Retard, Oxfil Long

LÄKEMEDEL	SYNONYM
Artonin	Melatan, Melatonin, Mellozzan
Armonve	Oxydona/Naloxone, Targin
Atarax	Hydroxyzin
Atomoxetin	Strattera
Avexol	Maxilloxacin
Azarga	Beizolamid/timolol
Azitromax	Azitromycin
Azitromycin	Azitromax
Azopt	Beizolamid
Bactrim	Eusaprim
Benferol	Kolecalciferol, Divisan
Betaklav	Amoxicillin/klavulanasyra, Bioclavid
Betametason	Betapred
Betapred	Betametason
Bimatoprost	Lumigan
Bioclavid	Amoxicillin/klavulanasyra, Betaklav
Bralus Zonda	Spiriva Handihaler
Bricka	Lurica, Proxhalin

LÄKEMEDEL	SYNONYM
Cefuroxim	Zinacef
Cinacalcet	Mimpara
Citodon	Paracetamol/kodoin
Clindamycin	Dalacin
Cloxacillin	Ekvacillin
Colrefuz	Kolkin
Combivent	Ipratropiumbromid/salbutamol
Comtes	Entakapon
Confidex	Ocplex
Cortimyk	Daktacort
Cosopt	Dorzolamid/timolol
Cyklokapon	Trancamasyra
Cyklokapon inj.	Statrasen inj., Pilexam inj.
Cymbalta	Duloxetin
Cymeve	Ganciclovir
Dabigatran	Pradaxa
Daktacort	Cortimyk
Dalacin	Dalacin
Derol	Derol

LÄKEMEDEL	SYNONYM
Elocon	Elocon
EMLA	EMLA
Entakapon	Entakapon
Ergenyl	Ergenyl
Ergenyl Retard	Ergenyl Retard
Eketamin	Eketamin
Emerson	Emerson
Eralpha	Eralpha
Etoricoxib	Etoricoxib
Eusaprim	Eusaprim
Exelon	Exelon
Fenoximetypenicillin	Fenoximetypenicillin
Fentanyl plåster	Fentanyl plåster
Flazyr	Flazyr
Flagyl	Flagyl
Flukloxacillin	Flukloxacillin
Flukonazol	Flukonazol
Forum	Forum

Sammanställning av PULVERINHALATORER – produkter i Region

	Breezhaler	Diskus	Easyhaler	Ellipta	F
Kortverkande beta-2 stimulerare SABA		 Ventoline (salbutamol)	 Buventol (salbutamol)		
Inhalationssteroid ICS		 Flutide (flutikason)	 Glon (budesonid)  Beclomet (beklometason)		
Långverkande beta-2 stimulerare LABA	 Onbrez (indakaterol)	 Serevent (salmeterol)			
Kombination ICS+LABA	 Alectura (mometason + indakaterol)	 Salmex (flutikason + salmeterol)  Salmeterol/Fluticasone	 Bofomix (budesonid + formoterol)  Salfumix (flutikason + salmeterol)	 Relvar (flutikason + vilanterol)  Airflusal (flutikason + salmeterol)	
Långverkande antikolinergika LAMA	 Seebri (glykopyrrol)		 Incruse (umeklidinium)	 Eklira (aktidinium)	
Kombination LAMA+LABA	 Ultibro (glykopyrrol + indakaterol)		 Anoro (umeklidinium + vilanterol)	 Duaklir (aktidinium + formoterol)	
Kombination LAMA+LABA+ICS	 Enerzair (glykopyrrol + indakaterol + mometason)		 Trelegy (umeklidinium + vilanterol + flutikason)		

Notera vikten av att instruera och följa upp patientens inhalationsteknik!

Uppdaterad 2024-01-01

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2024
KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2024
VUXNA

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2024
BARN

Läkemedelsbehandling av de MEST SJUKA OCH SKÖRA ÄLDRE
BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER 2024

Receptfria läkemedel mot allergi 2024

Substans	Styrka (mg/ml)	Åldersgräns*
am-roglikat	20	ingen
am-roglikat	40	ingen
roglikat	0,5	ingen
roglikat	20 och 40	ingen
roglikat	20	ingen

Produkt	Substans	Styrka (µg/dos)	Åldersgräns*
Desonix	budesonid	32	6 år
Dymista	azelastin+flutikason	125+50	18 år
Flutikason	flutikason	50	12 år
Teva	budesonid	32	6 år
Livocab	levokabastin	50	Ingen
Livostin	levokabastin	50	Ingen
Mometason+	mometason	50	18 år
producentnamn	mometason	50	18 år
Mommax	triamcinolon	55	18 år
nasacort	mometason	50	18 år
nasacort	mometason	50	18 år
nasacort	flutikason	50	12 år

Substans	Styrka (mg/ml)	Åldersgräns*
loratadin	1	6 år
desloratadin	0,5	6 år

gräns avser receptfri försäljning för

innehållande mometason kan säljas till barn >3 år på rekommendation av

medicinska riktlinjerna "Allergisk rinokonjunktivit" för barn från 2-12 år respektive vuxna och barn > 12år" och även rekommendationer för receptbelagda läkemedel som får förskrivas av sjukvårdens med förskrivningsrätt.


Se även avsnitt Allergi i "Rekommenderade läkemedel 2024 vuxna respektive barn".

LÄKEMEDELSINFORMATION PÅ VÅRDGIVARWEBBEN

Läkemedel

- Rekommenderade läkemedel
- Läkemedel och läkemedelsnära produkter i kommunal vård
- Dosdispenserade läkemedel
- Restnoterade läkemedel
- Läkemedelshantering
- Utbildningar
- Läkemedelsgenomgångar

<http://www.regionkronoberg.se/vardgivare>



The screenshot shows the website for Region Kronoberg Vårdgivare. The header includes the logo and a search bar. A navigation menu lists various services, with 'VÅRDRIKTLINJER' (Clinical Guidelines) highlighted. A sidebar menu on the left lists topics related to medicines, with 'Läkemedel' (Medicines) selected. The main content area is titled 'Läkemedel' and features three cards: 'Rekommenderade läkemedel' (Recommended medicines), 'Restnoterade läkemedel' (Remaining medicines), and 'Utbildningar' (Education). Below these, there are two news sections: 'LÄKEMEDELSNYHETER' (Medicine News) and 'Brist på Acetylcystein lösning' (Shortage of Acetylcystein solution). The first news item is 'Rekommenderade läkemedel 2024' (Recommended medicines 2024), dated 25 JANUARI 2024, with tags 'HÄLSA, VÅRD' and 'LÄKEMEDEL'. The second news item is 'Nyhetsbrev januari från medicinska kommittén och läkemedelskommittén' (Newsletter January from the medical committee and the medicines committee), dated 25 JANUARI 2024, with tags 'HÄLSA, VÅRD' and 'LÄKEMEDEL'. The third news item is 'Brist på Acetylcystein lösning' (Shortage of Acetylcystein solution), dated 19 JANUARI 2024, with tags 'HÄLSA, VÅRD' and 'LÄKEMEDEL'.

REGION KRONOBERG | VÅRDGIVARE

Sök på webbplatsen

VÅRDRIKTLINJER VÅRD- OCH PATIENTADMINISTRATION KOMPETENS OCH UTVECKLING SERVICE OCH UTRUSTNING ARBETSOMRÅDEN OCH PROCESSER

Medicinska riktlinjer
Ambulanssjukvård
Försäkringsmedicin
Hjälpmedel
Läkemedel
Beställa läkemedel
Dosdispenserade läkemedel
Förskriva läkemedel
Kostnadsansvar läkemedel
Läkemedel och läkemedelsnära produkter i kommunal vård
Läkemedels miljöpåverkan
Läkemedelsgenomgångar
Läkemedelshantering
Läkemedelsnyheter
Medicinska gaser
Rekommenderade läkemedel
Restnoterade och avregistrerade läkemedel
Subvention av läkemedel utanför förmån

Läkemedel

➔ Rekommenderade läkemedel
➔ Restnoterade läkemedel
➔ Utbildningar

LÄKEMEDELSNYHETER

➔ **Rekommenderade läkemedel 2024**
25 JANUARI 2024 **HÄLSA, VÅRD** **LÄKEMEDEL**
Årets läkemedelsrekommendationer finns nu tillgängliga på Vårdgivarwebben.

➔ **Nyhetsbrev januari från medicinska kommittén och läkemedelskommittén**
25 JANUARI 2024 **HÄLSA, VÅRD** **LÄKEMEDEL**
Information för medarbetare inom hälso- och sjukvården och tandvården.

➔ **Brist på Acetylcystein lösning**
19 JANUARI 2024 **HÄLSA, VÅRD** **LÄKEMEDEL**
Brist på Acetylcystein 200 mg/ml hela 2024 - förbehålls till SLUTEN VÅRD för att säkerställa tillgång till antidot vid paracetamolförgiftning.

REKOMMENDATIONERNA PÅ WEBBEN

Läkemedel

Rekommenderade läkemedel

Rekommendation vuxna

Rekommendation barn

Rekommendation äldre

Övergripande

Rekommenderade läkemedel

Läkemedelskommittén presenterar årligen aktuella rekommendationer för läkemedelsbehandling av vuxna och barn.

Målsättningen är att ge stöd till ändamålsenliga läkemedelsval. Underlagen tas fram av regionens medicinska grupper och läkemedelsråd.

→ Nyheter i Rekommenderade läkemedel 2024, pdf, öppnas i nytt fönster



→ Rekommendation Vuxna



→ Rekommendation Barn



→ Rekommendation Kommun



→ Utbytbara läkemedel



→ Typ 2-diabetes behandling



→ Sammanställning inhalatorer

Beställning av trycksaker



Särtryck och trycksaker för utskrift



Läkemedel

Rekommenderade läkemedel

Rekommendation vuxna

Allergi

Anemier

Diabetes

Graviditet

Gynekologi

Hjärta och kärl

Hormoner och Vitamin D

Hud

Infektioner

Kronisk njursvikt

Mage och tarm

Munhåla

Neurologi och stroke

Obesitas

Obstruktiva lungsjukdomar

Palliativ vård i livets slutskede

Psykiatri

Rörelseorganen

Smärta

Tobaksavvänjning

Urologi och inkontinens

Hjärta och kärl

Icke farmakologisk behandling

Kartlägg alltid följande:

- Fysisk aktivitet.
- Tobaksbruk. Erbjud alltid tobaksavvänjning.
- Matvanor. Uppmärksamma risk för undernäring och övervikt.
- Snarkning med andningsuppehåll.
- Stressnivå.
- Riskbruk av alkohol. Höjer blodtrycket och ökar risken för förmaksflimmer.

Kardiovaskulär sekundärprevention



Hypertoni



Hyperlipidemi



Kranskärslssjukdom



Perifer kärlsjukdom



Förmaksflimmer/fladder



Hjärtsvikt



Venös tromboembolism



Hemostatika



◀ Läkemedel

Rekommenderade läkemedel ▼

Rekommendation vuxna ▶

Rekommendation barn ▶

Rekommendation äldre

Övergripande ▶

Rekommendation äldre

Vid läkemedelsbehandling av äldre finns många faktorer att ta hänsyn till. Både vad gäller patientens förmåga och funktion, men även läkemedlens egenskaper i form av biverkningsprofil, metabolism och utsöndring.

Sedan flera år har vi i Region Kronoberg valt att hänvisa till gemensamma behandlingsrekommendationer för de mest sjuka och sköra äldre. De har sitt ursprung i Uppsala-Örebroregionen men tas numera fram i samarbete mellan ännu fler av Sveriges regioner. Region Kronoberg är genom Medicinsk grupp Äldre, delaktig i arbetet med den senaste upplagan.

[Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre 2024-2025](#) ↗

Ny version av bakgrundsmaterialet kommer i feb-mars 2024

För att beställa ett eller flera tryckta exemplar av rekommendationerna kontakta:

lakemedelskommitten@kronoberg.se

RELATERADE LÄNKAR

[Läkemedel som bör undvikas till äldre.pdf](#)





Medicinska riktlinjer ▶

Ambulanssjukvård ▶

Försäkringsmedicin ▶

Hjälpmiddel ▶

Läkemedel ▼

Beständ läkemedel

Doseddispenserade läkemedel

Förskriva läkemedel

Kostnadsansvar läkemedel

Läkemedel och läkemedelsnära
produkter i kommunal vård

Läkemedels miljöpåverkan

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelshantering

Läkemedelsnyheter

Medicinska gaser

Rekommenderade läkemedel

Restnoterade och avregistrerade
läkemedelSubvention av läkemedel utanför
förmån

Upphandlade läkemedel

Utbildningar läkemedel ▶

Primärvårdens jourverksamhet

Provtagning och diagnostik ▶

Smittskyddsenheten Kronoberg ▶

Restnoterade och avregistrerade läkemedel

Läkemedelsenheten bevakar löpande tillgängligheten för läkemedel som används såväl på recept som rekvisition. Rekommendation om alternativ tas fram i samråd med läkemedelskommittén och berörda verksamheter.

[Avregistrerade läkemedel](#)

Restnoterade läkemedel

Listan är inte fullständig, men försöker täcka de rester som är av större betydelse i klinisk vardag (berör många patienter eller många förskrivare). Klicka på läkemedelsnamnet i tabellen för att ta del av mer information och rekommenderade alternativ. Under tabellen finns länkar till Läkemedelsverkets och Dosapotekets restsidor.

Läkemedel	Preliminärt tillbaka	Uppdaterad
Abbotcin (erytromycin) tabl. 250 mg	v. 19, 2024	2024-01-12
Acetylcystein lösning 200 mg/ml	begränsad tillgång hela 2024	2024-01-19
Actilyse (alteplas) inj. 2 mg	v. 1, 2025	2023-09-15
Alvedon (paracetamol) supp. 60 mg, 125 mg, 250 mg, 500 mg	v. 27, 2024	2024-01-18
Amoxicillin tab. 500 mg resp. 750 mg.	v. 1, 2025	2024-01-19
Bondil (alprostadi) uretralstift, 500 µg resp. 1000 µg.	v. 1, 2026	2023-10-13
Carbocain (mepivakain) inj. 10 mg/ml, 20 mg/ml	v. 16, 2024	2023-11-03

Information om
restnoterade
läkemedel!

Medicinska riktlinjer	▶
Ambulanssjukvård	▶
Försäkringsmedicin	▶
Hjälpmedel	▶
Läkemedel	▼
Beställa läkemedel	
Dosdispenserade läkemedel	
Förskriva läkemedel	
Kostnadsansvar läkemedel	
Läkemedel och läkemedelsnära produkter i kommunal vård	
Läkemedels miljöpåverkan	
Läkemedelsgenomgångar	
Läkemedelshantering	
Läkemedelsnyheter	
Medicinska gaser	
Rekommenderade läkemedel	▶
Restnoterade och avregistrerade läkemedel	
Subvention av läkemedel utanför förmån	
Upphandlade läkemedel	
Utbildningar läkemedel	▶
Primärvårdens jourverksamhet	
Provtagning och diagnostik	▶
Smittskyddsenheten Kronoberg	▶
Strama Kronoberg	▶
Strålsäkerhet	▶
Tandvård	▶
Vårdhygieniska rutiner och Vårdhandboken	

Läkemedel och läkemedelsnära produkter i kommunal vård

Information om beställning av läkemedel, läkemedelsnära produkter och medicinsk gas inom kommunal hälso- och sjukvård.

Aktuell leveransinformation

2023-10-27

Förändringar i läkemedelssortiment i de kommunala basförråden bland annat på grund av restnoteringar:

Läkemedel	Ersätts av	Kommentar
Amoxicillin 500 mg, tablett	Amoxicillin/Amimox 750 mg, tablett	P.g.a restnotering. Obs annan styrka!
Klorhexidinsprit Fresenius Kabi 5 mg/ml	Klorhexidinsprit Abboxia 5 mg/ml	P.g.a. restnotering Åtgärder vid brist på klorhexidinsprit, pdf
Kåvepenin 800 mg, 1 g tabl	Tillgängligt generika i motsvarande styrka - Fenoximetylpenicillin, Kåvepenin eller Tikacillin	P.g.a restnotering
Novaluzid tablett 30 st	Novaluzid tablett 100 st	P.g.a. restnotering

[Restnoterade läkemedel, öppnas i nytt fönster](#)

Läkemedelsnära produkter

Beställningsrutiner



Kontakt och support Beställningsservice



Reklamation och retur



Läkemedel

Upphandlade läkemedel	▶
Primärvårdens jourverksamhet	
Provtagning och diagnostik	▶
Smittskyddsenheten Kronoberg	▶
Strama Kronoberg	▶
Strålsäkerhet	▶
Tandvård	▶
Vårdhygieniska rutiner och Vårdhandboken	
Vårdhygien	▶
Vårdöverenskommelser	▶
Rehabilitering	

Läkemedelsnära produkter

Beställningsrutiner



Kontakt och support Beställningsservice



Reklamation och retur



Läkemedel

Beställningsrutiner



Rekommenderade läkemedel i kommunal vård



Rekommenderade läkemedel kommunal hälso- och sjukvård 2024 innehåller:

- Generellt direktiv om läkemedelsbehandling i kommunal hälso- och sjukvård
- Riktlinje om läkemedelsförråd i kommunal hälso- och sjukvård
- Läkemedelssortiment i kommunala basförråd 2024
- Akutask - innehåll och behandlingsanvisning (finns också som beställningsbart särtryck)
- Information om läkemedelsnära produkter, diabetes- och sårbehandling

[Rekommenderade läkemedel kommunal hälso-och sjukvård 2024, pdf, öppnas i nytt fönster](#)

[Nytt i rekommendationerna 2024, pdf, öppnas i nytt fönster](#)

[Övriga läkemedelsrekommendationer, öppnas i nytt fönster](#)

Kontakt och support Läkemedelsenheten



Ordination



Medicinsk gas

Beställningsrutiner



Instruktioner



Kontakt och support



Beställningssystem

Lathundar



Anmäla/avanmäla beställare



KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

- Generellt direktiv om läkemedelsbehandling i kommunal hälso- och sjukvård
- Riktlinje om läkemedelsförråd i kommunal hälso- och sjukvård
- Läkemedelssortiment i kommunala basförråd 2024
- Akutask – innehåll och behandlingsanvisning (finns också som beställningsbart särtryck)
- Information om läkemedelsnära produkter, diabetes- och sårbehandling



KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Generellt direktiv om läkemedelsbehandling samt akutask

- Tapin/Emla har lagts till vid omläggning av smärtsamma sår
- Förtydliganden angående maxdoser



KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Tillfälligt uppehåll av läkemedel vid intorkning

- **Metolazon** och **Etoricoxib** har lagts till i listan över läkemedel när tillfälligt uppehåll kan göras utan läkarkontakt

REKOMMENDERADE
LÄKEMEDEL 2024
VUXNA

REGION
KRONOBERG

TILLFÄLLIGT UPPEHÅLL VID INTORKNING

Intorkning kan leda till akut njurvikt. Vissa läkemedel ökar denna risk. Hög ålder, redan nedsatt njurfunktion ökar risken ytterligare. Etablerad njurvikt medför desuom risk för intorkning av vissa läkemedel.

Exempel på situationer är:

- ihållande diarré
- upprepade kräkningar
- svår infektion
- andra kliniska tecken på intorkning (torra slemhinnor, nedsatt hudturgor, låg urinproduktion, förvirring)
- svårigheter att äta eller dricka på grund av akut sjukdom
- vätskeförluster under värmebölja

Nedanstående grupper av läkemedel bör tillfälligt pausas vid tecken till intorkning eller stor risk för detta (observera även kombinationer där dessa läkemedel ingår):

Metformin (Janumet, Synjardy, Velmetia) m.fl.

Sulfonureider: glimepirid, repaglinid

SGLT2-hämmare: empagliflozin (Jardiance, Synjardy, Glyxambi), dapagliflozin (Forxiga, Xigduo), kanagliflozin (Invokana), ertugliflozin (Steglatro, Segluromet, Steglujan)

Aktivt D-vitamin: alfakalcidol (Etalpha), kalcitriol (Rocaltrol)

Digoxin

Metolazon

ACE-hämmare: enalapril, ramipril m.fl.

ARB: losartan, kandesartan, valsartan (Entresto) m.fl.

NSAID: ibuprofen, diklofenak, ketoprofen, naproxen, etoricoxib m.fl.

Litium (Lithionit)

Antidepressiva (ålder över 65 år): citalopram, escitalopram, sertralín, venlafaxin, duloxetin, mirtazapin, vortioxetin (Brintellix) m.fl.

Läkemedelsgrupp	Uppföljning
Metformin (Janumet, Synjardy, Velmetia m fl)	Blodsocker
Sulfonureider: glimepirid, repaglinid (Novonorm)	Blodsocker
SGLT2-hämmare: empagliflozin (Jardiance, Synjardy, Glyxambi), dapagliflozin (Forxiga, Xigduo), kanagliflozin (Invokana), ertugliflozin (Steglatro, Segluromet, Steglujan)	Blodsocker
Aktivt D-vitamin: alfakalcidol (Etalpha), kalcitriol (Rocaltrol)	
Digoxin	Puls och blodtryck
Metolazon	Blodtryck
ACE-hämmare: enalapril, ramipril m fl	Blodtryck
ARB: losartan, kandesartan, valsartan (Entresto) m fl	Blodtryck
NSAID: ibuprofen (Brufen, Ipren, Ibumetin), diklofenak (Voltaren), ketoprofen (Orudis), naproxen (Pronaxen), etoricoxib m fl	Smärtbedömning
Litium (Lithionit)	Psykiiskt tillstånd
Antidepressiva (ålder över 65 år): citalopram (Cipramil), escitalopram (Cipralex), sertralín (Sertrone, Zolofit), venlafaxin (Efexor), duloxetin (Cymbalta), mirtazapin, vortioxetin (Brintellix) m fl	Psykiiskt tillstånd



KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Även för följande läkemedel kan paus eller dosminskning övervägas efter läkarkontakt

Läkemedelsgrupp	Uppföljning
DPP4-hämmare, GLP1-analoger: sitagliptin (Januvia, Xelevia), saxagliptin (Onglyza), liraglutid (Victoza, Saxenda, Xultophy), semaglutid (Ozempic, Rybelsus) mfl	Blodsocker
Diuretika: furosemid (Furix, Lasix), hydroklortiazid, spironolakton, eplerenon mfl	Blodtryck, ödem, andnöd
Antiepileptika: gabapentin, pregabalin (Lyrica), levetiracetam (Keppra), karbamazepin (Tegretol) mfl	Psykiskt tillstånd, kramper
Neuroleptika: risperidon (Risperdal), haloperidol (Haldol), kvetiapin (Seroquel, Quetiapin), olanzapin (Zyprexa) mfl	Psykiskt tillstånd



LÄKEMEDELSFÖRRÅD KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

- Hälso-och sjukvårdslagen säger att regionen får erbjuda personer på särskilt boende och personer som har hemsjukvård, läkemedel utan kostnad ur läkemedelsförråd
- Läkemedelskommittén beslutar utbudet
- Läkemedelskommittén fastställer även generella direktiv för läkemedelsbehandling
- När läkemedel ges utifrån generella direktiv ska effekten följas upp. Patientens läkare ska för det mesta informeras.

LÄKEMEDELSFÖRRÅD KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

- Läkemedel ur förråd **kräver** ordination
- Gäller för registrerad hemsjukvårdspatient
- Innebär ingen läkemedelskostnad för patienten
- Dokumentation ska ske i patientens journal

MED SVAMPINFEKTION (KLINISKT ELLER
ODLINGSVÄRIFIERAT)

1. Locacorten Vioform (flumetason+kloninol)
2. Metylosanilinlösning 0,5% (gentianaviolett)
3. OtoDry Borsyraspray 3% (receptfritt, ej läkemedel)
3. Klotrimazol 10 mg/g påstrykes eller på tamponad

ICKE-ALLERGISK RINIT

1. Mometason
2. Atrovent Nasal (ipratropium) vid långvarig rinnsnuva

LÄKEMEDELSSORTIMENT I KOMMUNALA BASFÖRRÅD 2024

ALLERGI

- Betapred (betametason) tablett 0,5 mg
Betapred (betametason) injektionsvätska 4 mg/ml
Desloratadin tablett 5 mg
Epipen/Jext (adrenalin) injektionspenna 300 mikrogram

BLOD OCH KOAGULATION

- Tranexamsyra/Cyklokapon (tranexamsyra) tablett 500 mg
Klexane (enoxaparin) injektionsvätska 2 000 E (20 mg)
/0,2 ml

DIABETES

- Glucagon (glukagon) endosspruta 1 mg
Glukos injektionsvätska 300 mg/ml
Insulin lispro Sanofi injektion 100 E/ml

HJÄRTA OCH KÄRL

- Acetylsalicylsyra tablett 75 mg
Furix (furosemid) injektionsvätska 10 mg/ml
Furix (furosemid) tablett 40 mg
Nitrolingual (nitroglycerin) spray 0,4 mg/dos

HUD

- Alsolsprit 10 mg/ml
Canoderm (karbamid) kräm 5 %
Cortimyk (mikonazol+hydrokortison) kräm
Emovat (klobetasonbutyrat) kräm 0,05 %
Klorhexidinsprit 5 mg/ml

70

- Mildison (hydrokortison) kräm 1%
Ovixan (mometasonfuroat) kräm 0,1 %
Pevaryl (ekonazol) kräm 1 %
Ättiksyra APL lösning 5 mg/ml – för spolning av infekterade sår, se produktresumé APL

INFEKTIONER

- Amoxicillin tablett 750 mg
Bactrim (trimetoprim+sulfametoxazol) tablett
Cefadroxil kapsel 500 mg
Cefotaxim injektions/infusionssubstans 1 g
Ciprofloxacin tablett 500 mg
Clindamycin (klindamycin) kapsel 300 mg
Doxycyklin tablett 100 mg
Flukloxacillin tablett 1 g
Idotrim (trimetoprim) tablett 160 mg
Kävepenin (fenoximetylpencillin) tablett 800 mg och 1 g
Nitrofurantoin tablett 50 mg
Nystatin oral lösning 100 000 E/ml
Paxlovid (nirmatrelvir+ritonavir) tablett 150+100mg – finns i ett förråd/kommun
Selexid (piromecillinam) tablett 200 mg
Tamiflu (oseltamivir) tablett 30 mg
Valaciclovir tablett 500 mg

KRAMPER

- Midazolam/Buccolam munhålelösning 10 mg
Diazepam Desitin rektallösning 10 mg

LUFTVÄGAR

- Bricanyl (terbutalin) injektionsvätska 0,5 mg/ml
Conoxia (andningsoxygen) flaska 3 och 10 liter med inbyggd regulator
Ventoline Evohaler (salbutamol) inhalationspray 0,1 mg/dos
Andningsbehållare + mask

MAGE OCH TARM

- Cilaxoral/Laxoberal (natriumpikosulfat) droppar 7,5 mg/ml
Klyx (natriumdokusat+sorbitol) klysma 120 ml
Laktulos oral lösning 670 mg/ml
Loperamid kapsel 2 mg
Movicol (makrogol) dospulver
Novaluzid (aluminium+magnesium) tuggtablett

71

- Omeprazol kapsel 20 mg
Ondansetron munsönderfallande tablett 4 mg
Postafen (meklozin) tablett 25 mg
Primperan (metoklopramid) injektionsvätska 5 mg/ml
Resulax (sorbitol) klysma 850 mg/ml

PALLIATIV VÅRD/VILS

- Furix (furosemid) injektionsvätska 10 mg/ml
Haldol (haloperidol) injektionsvätska 5 mg/ml
Midazolam injektionsvätska 5 mg/ml
Morfin injektionsvätska 10 mg/ml
Robinul (glykopyrron) injektionsvätska 0,2 mg/ml
Oftagel (carbomer) öngongel 2,5 mg/g

SMÄRTA

- Alvedon (paracetamol) tablett 500 mg
Ibuprofen tablett 400 mg
Instillagel (lidokain) gel 20,9 mg
Morfin injektionsvätska 10 mg/ml
Morfin tablett 10 mg
Oxynorm/Oxikodon (oxikodon) kapsel 5 mg
Paracetamol suppositorium 1 g
Tapin/EMLA (lidokain+prilokain) kräm
Xylocain (lidokain) gel 2 %

ORO/SÖMN

- Heminevrin (klometiazol) kapsel 300 mg
Oxascand (oxazepam) tablett 5 mg
Risperidon tablett 0,25 mg
Zopiklon tablett 5 mg

VÄTSKOR/ELEKTROLYTLÖSNINGAR

- Glukos buffrad 25 mg/ml infusionslösning
Natriumklorid 9 mg/ml spädningsvätska 10 och 20 ml, spolvätska 30 ml och 120 ml (bälg)
Ringer-Acetat infusionslösning
Sterilt vatten spädningsvätska, 10 och 20 ml

ÖGA

- Fucithal (fusidinsyra) ögonsalva 1%

ÖVRIGT

- Naloxon injektion 0,4 mg/ml

72

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Sortiment i läkemedelsförråd i kommunal hälso- och sjukvård

Beställningsmallarna är uppdaterade

- **Jext/Epipen** ersätter Emerade/Jext
- Amoxicillin ändras från 500 till **750mg**
- **Paxlovid** (*nirmatrelvir+ritonavir*) läggs till i utvalda förråd (ett per kommun)

ÖNSKEMÅL FRÅN VERKSAMHETERNA - BESLUT FRÅN LM-KOMMITTÉN

- Jag skulle gärna önska ett snabbare flöde (som för anafylaktisk chock) även för hjärtinfarkt, lungödem och förstoppning. Finns det en specifik ordning för hur vi ska handla i dessa fall? Tex lungödem, var ska vi börja? Med nitro-sen morfin-sista hand furix och O2?

Framgår under kapitlet "akutask" (dock inte för förstoppning)

- **Önskar att Souvenaid upphandlas till våra nydiagnostiserade demenssjuka patienter**

Från hittills publicerade data kan man inte vara säker på om Souvenaid ger någon klinisk relevant fördel för personer med mild kognitiv funktionsnedsättning. Enligt MG Äldre räcker inte evidensen till för att rekommendera förskrivning av Souvenaid.

- **Fuktighetsbevarande /smörjande ögondroppar vid palliativ vård**

Oftagel finns i förrådet, men kräver ordination som övriga läkemedel vid VILS

ANEMI – JÄRNBRIST

1. Järn lågdoserat, receptfritt

1. Duroferon (*ferrosulfat*)

1. Niferex (*ferroglycinsulfat*)

Niferex 30 mg/ml orala droppar

- Tillverkningen har upphört
- Generell licens beviljad
- Glutaferro 170 mg/ml – begränsad tillgång
- Används i första hand till nyfödda barn med järnbrist



SGLT2-HÄMMARE

Diabetes – Hjärtsvikt – Kronisk njursjukdom

Dubbla rekommendationer

Forxiga (dapagliflozin)

Jardiance (empagliflozin)



TYP 2-DIABETES - NY ALGORITM

Fetma BMI >30	Manifest kardiovaskulär sjukdom	Hjärtsvikt	Nedsatt njurfunktion (eGFR < 30 ml/min)	Mest sjuka äldre	Patienter utan samsjuklighet
Rökstopp och levnadsvanor					
1. Metformin*	1. Metformin*	1. Metformin*			1. Metformin*
2. GLP-1-RA** 3. SGLT-2-hämmare	2. SGLT-2-hämmare 3. GLP-1-RA**	2. SGLT-2-hämmare	1. DPP-4-hämmare** 2. Repaglinid 3. Insulin	1. DPP-4-hämmare** 2. Insulin	2. DPP-4-hämmare** 3. SGLT-2-hämmare 4. GLP-1-RA** 5. Insulin
* Vid eGFR 30–44: Max dos 1000 mg/dygn. Vid eGFR 45–59: Max dos 2000 mg/dygn. Vid eGFR >60: Max dos 3000 mg/dygn. ** Både GLP-1-RA och DPP-4-hämmare är inkretinläkemedel och ska ej kombineras. Reducerad dos vid nedsatt njurfunktion. OBS! SGLT2-hämmare kan användas i njurskyddande syfte vid hjärtsvikt, oberoende av HbA1c-nivå.					

TYP 2-DIABETES - NY ALGORITM

Fetma (BMI >30 kg/m2)	Manifest kardiovaskulär sjukdom	Hjärtsvikt	Nedsatt njurfunktion (eGFR < 30 ml/min)	Mest sjuka äldre	Patienter utan samsjuklighet
Rökstopp och levnadsvanor					
1. Metformin*	1. Metformin*	1. Metformin*			1. Metformin*
2. GLP-1-RA** Ozempic (semaglutid) Victoza (liraglutid) Viktsänkande++ Låg hypoglykemisk Gastrointestinala bieffekter 3. SGLT-2-hämmare Forxiga (dapagliflozin) Jardiance (empagliflozin) Viktsänkande+ Låg hypoglykemisk Risk för urogenital infektion, ketoacidosis	2. SGLT-2-hämmare Forxiga (dapagliflozin) Jardiance (empagliflozin) Viktsänkande+ Låg hypoglykemisk Risk för urogenital infektion, ketoacidosis 3. GLP-1-RA** Ozempic (semaglutid) Victoza (liraglutid) Viktsänkande++ Låg hypoglykemisk Gastrointestinala bieffekter	2. SGLT-2-hämmare Forxiga (dapagliflozin) Jardiance (empagliflozin) Viktsänkande+ Låg hypoglykemisk Risk för urogenital infektion, ketoacidosis	1. DPP-4-hämmare** Sitagliptin 25 mg Viktneutralt Låg hypoglykemisk 2. GLP-1-RA** Ozempic (semaglutid) Victoza (liraglutid) Viktsänkande++ Låg hypoglykemisk 3. Repaglinid Iakttag försiktighet, starta med låg dos (0,5 mg) till måltiderna (1-3 ggr/dag) Risk för hypoglykemi och viktuppgång. 4. Insulin (se nedan) Risk för hypoglykemi och viktuppgång.	1. DPP-4-hämmare** Sitagliptin 25-50 mg Viktneutralt Låg hypoglykemisk 2. Insulin (se nedan) Risk för hypoglykemi och viktuppgång.	2. DPP-4-hämmare** Sitagliptin 25-50 mg Behov måttlig effekt, viktneutralitet, ej hypoglykemi 3. SGLT-2-hämmare Forxiga (dapagliflozin) Jardiance (empagliflozin) Viktsänkande+ Låg hypoglykemisk Risk för urogenital infektion, ketoacidosis 4. GLP-1-RA** Ozempic (semaglutid) Victoza (liraglutid) Viktsänkande++ Låg hypoglykemisk Gastrointestinala bieffekter 5. Insulin (se nedan) Behov upptitreringsbar effekt Risk hypoglykemi, vikt- uppgång

* Vid eGFR 30–44: Max dos 1000 mg/dygn. Vid eGFR 45-59: Max dos 2000 mg/dygn.

Vid eGFR >60: Max dos 3000 mg/dygn.

** Både GLP-1-RA och DPP-4-hämmare är inkretinläkemedel och ska ej kombineras. Reducerad dos vid nedsatt njurfunktion.

*** Alla snabbverkande insulin är likvärdiga och av kostnadsskäl väljs det billigaste alternativet vid nysättning och receptförnyelse.


OBS! SGLT2-hämmare kan användas i njurskyddande syfte vid njursvikt, oberoende av HbA1c-nivå.

Insulin

**Långverkande
Basinsulin
Snabbverkande
insulin**

**Abasaglar
Humulin NPH
Insulin aspart Sanofi*** (biosimilar till NovoRapid)
Insulin lispro Sanofi*** (biosimilar till Humalog)**

Diabetes typ 2 - prisjämförelse, kostnad för ett års behandling



Priser: Feb 2024

GYNEKOLOGI – ATROFISK VAGINIT

1. Ovesterin (östriol) vagitorier, vaginalkräm

2. Blissel (östriol) vaginalgel, lågdosalternativ

- Lokal vaginal östrogenbehandling kan ges till kvinnor med behandlad bröstcancer (även aromatashämmare)

- Effektiv behandling utan systemisk påverkan

- Ej inom förmån

3. Oestring (östradiol) vaginalinlägg - restnoterad




EMBOLIPROFYLAX VID FÖRMAKSFLIMMER

- **Dabigatran** (generika till Pradaxa) väljs i första hand vid nyinsättning vid förmaksflimmer

1. Dabigatran

1. Eliquis (*apixaban*)

2. Warfarin Orion



HJÄRTSVIKT (HFrEF/HFmrEF)



Påbörja basbehandling så snabbt som möjligt med alla de fyra läkemedelsgrupperna som minskar dödlighet.

ACE-HÄMMARE/ARB

Candesartan

Enalapril

BETARECEPTORBLOCKERARE

Bisoprolol

Metoprolol

ALDOSTERONANTAGONISTER

Eplerenon

Spironolakton

SGLT2-HÄMMARE

Forxiga (*dapagliflozin*)

Jardiance (*empagliflozin*)

HJÄRTSVIKT (HFrEF/HFmrEF)



DIURETIKA

1. Furix (*furosemid*)

2. Metolazon

Vid svår och recidiverande vätskeretention kan lågdos metolazon (½ tabl x1, mån och tors) övervägas.

NEPRILYSINHÄMMARE MED ARB (ARNI)

Entresto (*valsartan+sakubitril*) (S)

HUD – EKSEM

NYTT: kommentar angående **melaninrik hud**

- Rodnaden blir mindre framträdande och mer **lilaaktig** vilket gör det lätt att undervärdera graden av inflammation och därmed underbehandla eksemet
- Torrhet och fjällning blir mer framträdande
- Hypo-/hyperpigmentering kan förekomma

NYTT: kommentar angående lokala glukokortikoider

- **Smörjning en gång dagligen** rekommenderas då det inte ger större effekt att smörja två gånger

INFEKTIONER

Clostridioides difficile-infektion

Vid pågående antibiotikabehandling, sätt om möjligt ut behandlingen.

Vid lindriga symtom kan man avvakta med läkemedelsbehandling (aktiv exspektans 2 dagar). Asymtomatiska bärare behandlas ej.


Värdera indikation för pågående protonpumpshämmarbehandling.

1. Vancomycin i 10 dagar

2. Metronidazol i 10 dagar, möjligt alternativ om opåverkad patient

- Vid svår infektion, behov av fortsatt antibiotikabehandling mot annan infektion, terapisvikt (efter 5 dygns behandling) eller recidiv, kontakta infektionsläkare.

Antibiotika (J01 exkl Hiprex), antal uthämtade recept/1000 invånare och år



KRONISK NJURSVIKT

SGLT2-hämmare

Forxiga (*dapagliflozin*)

Jardiance (*empagliflozin*)

- Kan sättas in vid GFR mellan 75 och 20 ml/min och **makroalbuminuri** (u-Alb/Krea >30 g/mol) tillsammans med RAAS-blockad eller när sådan är olämplig.
- Försiktighet vid t.ex. dehydrering, fasta, kolhydratfattig kost och lågt BMI p.g.a. ökad risk för ketoacidosis som kan uppkomma även vid typ 2-diabetes och nära normoglykemi.

IBS - BUKSMÄRTA

1. Paracetamol
2. Papaverin APL
3. **Colpermin** (*pepparmyntsolja*) (ej läkemedelsförmån)
4. Amitriptylin



MUNHÅLA - KARIES



Dentan (*natriumfluorid*) lösning


Natriumfluorid (*natriumfluorid*) tandkräm 5mg/g

- Vid kariessjukdom eller vid hög risk för karies, från 16 år
- Försiktighet vid kognitiv svikt, risk för nedsväljning av höga doser fluor

OBESITAS

- Förstahandsbehandling hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet
 - [Digitalt stöd för viktnedgång vid övervikt – 1177](#)
- Farmakologisk behandling vid: BMI $\geq$ 30 eller BMI $\geq$ 27 + minst en viktrelaterad komorbiditet (tex typ 2-diabetes, dyslipidemi eller hypertoni)
 1. **Wegovy** (*semaglutid*), ej läkemedelsförmån
 2. Saxenda (*liraglutid*), ej läkemedelsförmån
 - Utvärdera efter 12 v (minst 5 % viktminskning)
 - Hög recidivrisk vid utsättning, hög kostnad för patienten i längden
- Kirurgisk behandling vid: BMI $>$ 35 eller BMI $>$ 30 + obesitasrelaterad sjukdom

LÄKEMEDELSBEHANDLING VID ASTMA



Vid symtom högst 2 gånger i månaden enbart vid behovsmedicinering med ett kombinationsmedel med snabbt insättande effekt t ex Bufomix

LÄKEMEDELSBEHANDLING VID KOL

Senaste året	Symtom	Lindriga symtom CAT < 10	Betydande symtom CAT ≥ 10
0-1 exacerbation och 0 sjukhusinläggning		GOLD A LAMA eller LABA	GOLD B LAMA + LABA
≥ 2 exacerbationer eller ≥ 1 sjukhusinläggning		GOLD E LAMA+LABA+ICS	

UPPDATERAD INHALATORSAMMANSTÄLLNING

Sammanställning av **PULVERINHALATORER** – produkter med grön bakgrund är rekommenderade i Region Kronoberg 2024

	Breezhaler	Diskus	Easyhaler	Ellipta	Forspiro	Genuair	Handihaler	Nexthaler	Novolizer	Spiromax	Turbuhaler	Twisthaler	Zonda
Kortverkande beta-2 stimulerare SABA		 Ventoline (salbutamol)	 Buventol (salbutamol)										
Inhalations-steroid ICS		 Flutide (flutikason)	 Giona (budesonid)  Beclomet (beklometason)										
Långverkande beta-2 stimulerare LABA	 Onbrez (indakaterol)	 Serevent (salmeterol)											
Kombination ICS+LABA	 Aectura (mometason + indakaterol)	 Salmex (flutikason + salmeterol)  Salmeterol/Fluticasone Neutec	 Bufomix (budesonid + formoterol)  Salfumix (flutikason + salmeterol)	 Relvar (flutikason + vilanterol)  Airlusol (flutikason + salmeterol)									
Långverkande antikolinergika LAMA	 Seebri (glykopyrronium)			 Incruse (umeklidinium)									
Kombination LAMA+LABA	 Ultibro (glykopyrronium + indakaterol)			 Anoro (umeklidinium + vilanterol)									
Kombination LAMA+LABA+ ICS	 Enerzair			 Trelegy (umeklidinium + vilanterol + flutikason)									

Note

Pulver i första hand!

Sammanställning av **SPRAYINHALATORER** – produkter med grön bakgrund är rekommenderade i Region Kronoberg 2024

	Aerosphere	Autohaler	Evohaler	Respimat	Övriga sprayer			Spacer/Andningsbehållare
Kortverkande beta-2 stimulerare SABA		 Airomir Autohaler (salbutamol)	 Ventoline (salbutamol)		 Airomir (salbutamol)	 Airsalb (salbutamol)		- Mallar för förskrivning av spacer inklusive mask finns i Cambio Cosmic under rubriken förbrukningsartiklar och sökord "spacer" alt "andningsbehållare". - Inhalationsspray används tillsammans med spacer. Lämplig spacer är Optichamber Diamond. 
Inhalations-steroid ICS		 AeroBec Autohaler (beklometason)	 Flutide (flutikason) Icsoni (flutikason) Fluticasone Cipla		 AeroBec (beklometason)	 Alvesco (ciclesonid)		
Långverkande beta-2 stimulerare LABA			 Serevent (salmeterol)	 Striverdi (olodaterol)				 Exempel på andningsbehållare som går att använda mellan patienter efter rengöring (desinficering/ dekontaminering) är L'espace. 
Kombination ICS+LABA			 Seretide (flutikason + salmeterol) Salmeterol/Fluticasone Cipla		 Innovair (beklometason + formoterol)	 Flutiform (flutikason + formoterol)	 Symbicort (budesonid + formoterol)	
Kortverkande antikolinergika SAMA					 Atrovent (ipratropium) Ipravent (ipratropium)			
Långverkande antikolinergika LAMA				 Spiriva (tiotropium)				
Kombination LAMA+LABA	 Bevespi (glykopyrronium + formoterol)			 Spiolto (tiotropium + olodaterol)				 Trimbow (glykopyrronium + formoterol + beklometason)
	 Xeo (glykopyrronium + budesonid)							

Notera vikten av att instruera och följa upp patientens inhalationsteknik!

Uppdaterad 2024-01-01

TOBAKSAVVÄNJNING

1. **Nikotinläkemedel**
2. **Champix** (*vareniklin*) - Restnoterad
3. **Zyban** (*bupropion*)

Generell licens

- APO-Varenicline 0,5 mg (14 dagars ledtid)
- APO-Varenicline 1 mg (2 dagars ledtid)



PSYKIATRI - SÖMNSTÖRNING



Melatonin – välj **Aritonin**

- Endast förmån för: insomni 6-17 år med ADHD där sömnhygien varit otillräckligt
- Ej inom förmån för andra
- Melatonin ej generiskt utbytbara

Läkemedelsnamn	Styrkor (mg)	100 tabletter
Aritonin	2, 3, 4, 5	278 kr
Melatan (<i>Pascal</i>)	3, 5	550 kr
Mellozzan	0,5, 1, 2, 3, 4, 5	568 kr
Melatonin AGB	1, 2, 3, 4, 5	573 kr

ÄLDREPSYKIATRI – SÖMN

Aritonin (*melatonin*)

Mirtazapin

Zopiklon – endast för kortvarigt/intermittent bruk

- **Mirtazapin** 7,5-15 mg 1-2 timmar innan sänggåendet kan användas som rent sömnmedel när beroendeframkallande sömnmedel är olämpliga

Kan övervägas vid samtidig depression, men även då mycket oro och ångest finns tillsammans med sömnstörningen

Kan även ges "vid behov"


PSYKIATRI - TILLFÄLLIG ÅNGEST

1. Hydroxizin

1. Prometazin

1. Propranolol

2. Oxascand



AKUT SMÄRTA

- Behandlingstid **efter förmodad läkningstid**. Ofta oförutsägbart förlopp, vid nociceptiva tillstånd sällan mer än några dagar.
- Vid neuropatiska tillstånd ofta längre behandlingstider.
- Om opioider behövs vid akut smärta ska behandlingen avslutas inom 3-5 dygn
[Janusinfo](#)
- Syftet med kort behandlingstid är att underlätta för patienten att snabbare mobiliseras och få i gång kroppens endogena smärthämningssystem, vilket är viktigt för att smärtan ska gå över.
- **Kortverkande** opioider möjliggör bättre styrning och dosanpassning utifrån individuella behov och ger troligen mindre risk för beroendeutveckling.



ÖGON

- Långvarig restnotering på Fucithalmic (*fusidinsyra*) – hela 2024
- Licensläkemedel med fusidinsyra finns
- Fusidinsyra jämfört med kloramfenikol
 - Färre doseringstillfällen
 - Smalare antibiotiskt spektrum
 - Rekommenderas därför i första hand om det är tillgängligt (trots att licensläkemedlet kostar mer)
- Men kom ihåg att förstahandsbehandling vid infektiös konjunktivit är **INTE** antibiotika utan **mekanisk rengöring med ljummet vatten**

HÅLLBAR LÄKEMEDELSANVÄNDNING

- Begränsa antalet läkemedel – ofta fördel för både patient och miljö
- Regelbundna läkemedelsgenomgångar
- Liten förpackning vid nyförskrivning
- Utvärdera effekt och biverkningar
- Välj läkemedel med minst miljöpåverkan
- Lämna överblivna läkemedel till apotek

1	LÄKEMEDELSAVSTÄMMNING • Vilka läkemedel tar patienten (inklusive receptfria och/eller växtbaserade)? • Tar patienten läkemedlen på rätt sätt i rätt dos i rätt tid? Be gärna patienten visa (ex inhalationsläkemedel) • Har patienten sväljsvårigheter eller andra hanteringsproblem? Är beredningsformen lämplig? • Förstår patienten syftet med behandlingen?	Lokala riktlinjer för läkemedelsgenomgångar Medicininstruktioner.se Stöd vid läkemedelshantering – Region Skåne Kan läkemedlet krossas och/eller ges via sond?
2	UPPDATERA LÄKEMEDELSLISTAN Finns behov av fördjupad läkemedelsgenomgång? Nej > Dokumentera att enkel läkemedelsgenomgång är utförd via funktionsknapp "Genomgång" i läkemedelslistan i Cosmic. Läkemedelsrelaterade problem, åtgärder och uppföljning dokumenteras antingen i avsedda rutor eller hänvisas till journalanteckning. Ja - gå vidare till steg 3 Läkemedelsanalys.	Lokala riktlinjer för läkemedelsgenomgångar
3	LÄKEMEDELSANALYS Finns indikation (diagnos) för varje läkemedel? Nej > sätt ut/trappa ut Ja - för varje läkemedel bedöm: 1. Interaktioner med hjälp av funktion i läkemedelslistan i Cosmic/Pascal. Interaktionskontroll med växtbaserade läkemedel och/eller vissa livsmedel finns i Janusmed. 2. Njurfunktion. Beräkna absolut eGFR vid behov (vid lägre värden och/eller avvikande kroppsyta). 3. Effekt enligt patient, labprover och/eller undersökningar. OBS! läkemedel med smalt terapeutiskt intervall. 4. Risk-nyttan t ex varningar/försiktighet, kontraindikationer, graviditet, amning, blödningsrisk, fallrisk och påverkan på kognition. 5. Biverkningar. Finns en funktion i både läkemedelslistan i Cosmic och Pascal där man kan söka biverkningar. 6. Dos/behandlingstid, behov av justering? 7. Läkemedelsval. Är läkemedlet rekommenderat i Kronoberg?	FASUT användarnamn och lösenord: Kronoberg Broschyrer för nedtrappning av t.ex PPI, bensodiazepiner, zopiklon respektive opioider janusmed.se Interaktioner, riskprofil, njurfunktion, fosterpåverkan och amning. egfr.se för beräkning av absolut eGFR Referensintervall klinisk kemi ePed - Erfarenhets- och evidensbaserad databas för barnläkemedel Läkemedelsbehandling för de mest sjuka och sköra äldre Diagnostisk checklista för förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre (se sid 38) Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Läkemedel som bör undvikas till äldre – Region Kronoberg Symtomskatning av möjliga läkemedelsrelaterade symtom, PHASE-20, blanketten finns även i Cosmic. Rekommenderade läkemedel i Kronoberg
4	SAKNAS BEHANDLING? Ta ställning till eventuellt behov av icke-farmakologisk/ farmakologisk behandling.	Folkhälsa – levnadsvanor (tobak, alkohol, matvanor, fysisk aktivitet) "Säröbomb" – Recept på kaloriska drycker ex inför sänggående. Broschyr "Sov Gott"
5	UPPDATERA LÄKEMEDELSLISTAN igen och ge den till patienten. Har patienten recept? Informera patienten om eventuella förändringar.	Lokala riktlinjer för läkemedelsgenomgångar
6	DOKUMENTERA att fördjupad läkemedelsgenomgång är utförd via funktionsknapp "Genomgång" i läkemedelslistan i Cosmic. Läkemedelsrelaterade problem, åtgärder och uppföljning dokumenteras antingen i avsedda rutor eller hänvisas till journalanteckning.	Lokala riktlinjer för läkemedelsgenomgångar

TACK!

