

RAADS-14 Screen

En förkortad version av Ritvo Autism and Asperger Diagnostic Scale-Revised (RAADS-R)

Rättning:

- Alla items (utom fråga 6 som är reverserad och därför märkt *) skattas mellan 3 och 0.
- Den sammanlagda poängen kan variera mellan 0 och 42.

RAADS-14 Screen innehåller tre subskalor:

- Mentaliseringssvårigheter: fråga 1,4,9,11,12,13,14 (förklarar 32,5% av variansen)
- Social ångest: fråga 3,5,6,8 (förklarar 8,5% av variansen)
- Sensorisk reaktivitet: fråga 2,7,10 (förklarar 6,4% av variansen)

Medianpoäng i olika populationer:

- **32** poäng hos 135 vuxna med normal begåvning och diagnostiserade med autismspektrumstörning.
- **15** poäng hos 344 vuxna med normal begåvning och diagnostiserade med ADHD.
- **11** poäng i en sammanslagen grupp bestående av 164 vuxna med andra psykiatriska diagnoser: psykossjukdom (n=30), affektiv sjukdom (n=59), ångestsyndrom eller OCD (n=67) och borderline personlighetsstörning (n=39).
Eftersom vissa uppgivit flera olika diagnoser överstiger summan av diagnoser antalet deltagare.
- **3** poäng bland 590 vuxna icke-psykiatriska kontroller.

En cut-off på 14 poäng eller över, resulterade i 97% sensitivitet och en specificitet på:

- 46% för ADHD-gruppen.
- 64% för den sammanslagna gruppen med psykiatriska patienter som inte hade en känd autismspektrumstörning eller ADHD.
- 95% för gruppen av vuxna icke-psykiatriska kontroller.

Beräkning av den diskriminerande förmågan hos de första fem frågorna i RAADS-14 Screen gav följande resultat:

- En cut-off på 4 poäng eller fler (av maximalt 15 poäng) gav 93% sensitivitet och en specificitet på 45% i ADHD-gruppen, 49% hos gruppen med andra psykiatriska diagnoser än autismspektrumstörning eller ADHD, och 90% bland icke-psykiatriska kontroller.