

Läkemedel	Aciclovir-ratiopharm 250mg p.i (licensläkemedel från Tyskland)			
Styrka	250 mg			
Beredningsform	pulver till injektion/infusion			
Indikation	Infektion där Aciclovir bedöms vara det lämpligaste behandlingsalternativet.			
Administrationssätt	Intravenös infusion Ges med infusionspump i separat kanyl Infusionstid 60 minuter			
Spädning	Tvåstegsspädning!			
	Steg 1 (stamlösning)			
	Aciclovir	Löses i	Sterilt vatten	Slutkonc.
	250 mg	+	10 ml	25 mg/ml
	500 mg	+	20 ml	25 mg/ml
	750 mg	+	30 ml	25 mg/ml
	1000 mg	+	40 ml	25 mg/ml
	Steg 2 (infusionsvätska)			
	Stamlösning 25 mg/ml	Späds vidare i	Natriumklorid 9 mg/ml	Slutkonc.
	10 ml (250mg)	+	100 ml	2,3 mg/ml
	20 ml (500mg)	+	100 ml	4,2 mg/ml
	30 ml (750mg)	+	250 ml	2,7 mg/ml
	40 ml (1000mg)	+	250 ml	3,4 mg/ml
	- Lösningen ska omskakas - Koncentration i spädd infusionsvätska får inte överstiga 5 mg/ml - Hållbarhet efter spädning: Stamlösning får inte sparas! Infusionsvätska: 12 timmar i rumstemperatur			
Förpackning	5 x 250mg			
Ersätter	Aciclovir Pfizer koncentrat till injektions-/infusionsvätska 25mg/ml (registrerat läkemedel i Sverige)			
Övrigt	- Cytotoxiskt preparat, se skyddsinfo - Infusionskoncentrat och beredd infusionslösning får inte förvaras i kylskåp p.g.a. risk för utfällning!			