

Läkemedel	Ceftazidim Dr. Eberth 1 g och 2 g Ceftazidime Sterimax 1 g och 2 g <i>(licensläkemedel)</i>			
Styrka	1 g och 2 g			
Beredningsform	pulver till injektion/infusion			
Indikation	Infektion där ceftazidim bedöms vara det lämpligaste behandlingsalternativet.			
Administrationssätt	Intravenös injektion under 3-5 min Intravenös infusion. Infusionstid 20-30 minuter			
Spädning	Intravenös injektion			
	Ceftazidim	Löses i	Sterilt vatten	Slutkonc.
	1 g	+	10 ml	100 mg/ml
	2 g	+	10 ml	200 mg/ml
	Intravenös infusion			
	Ceftazidim	Löses i	Natriumklorid 9 mg/ml	Slutkonc.
	1 g	+	100 ml	10 mg/ml
	2 g	+	100 ml	20 mg/ml
	- Lösningen ska omskakas - Hållbarhet efter spädning: Används omedelbart			
Förpackning	5 x 1 g och 5 x 2 g (Dr Eberth), 10 x 1 g och 10 x 2 g (Sterimax)			
Ersätter	Fortum och Ceftazidim pulver till injektions-/infusionsvätska 1g och 2 g <i>(registrerat läkemedel i Sverige)</i>			
Övrigt	- Ljuskänsligt, ska förvaras i ytterkartong. - Färdigberedd lösning är ljus gul till bärnstensfärgad. Länk produktresumé Ceftazidim Dr Eberth Länk produktresumé Ceftazidime Sterimax			