


Dosering av engångsdos

För att undvika misstolkningar bör engångsdoser doseras med **kortnotation end** och **med sluttid "Efter" eller "Datum och tid"**. Vid sluttid väljs lämpligast ett antal timmar eller dagar framåt i tiden. I läkemedelslistan visas då bakgrunden på produkten och doseringen vit tills den valda tiden är inne då bakgrunden blir grå streckad, se sista raden nedan. Tooltip på texten "Behandlingen avslutad" visar tiden man har angett vid Slut.



The screenshot shows a software interface for medication dosing. It features two main input sections, each enclosed in an orange border. The top section is for a dose of 100 ml, and the bottom section is for 200 ml. Both sections have a 'Dosering:' label, a unit dropdown (set to 'ml'), and a text input for the dose amount followed by 'end'. Below this, there are 'Start:' and 'Slut:' (End) fields. The 'Start:' field has a dropdown for 'Datum och tid' and a date/time picker. The 'Slut:' field has a dropdown for 'Efter' and a time input (set to 8 timmar). A tooltip icon (blue circle with 'i') is visible next to the '8 timmar' input. At the bottom, there is a table titled 'Aktuella läkemedelsbehandlingar [3]' showing three rows of medication data with status indicators and end times.

Aktuella läkemedelsbehandlingar [3]					
Erytrocyter - SAGMAN	200 ml x 1 i 1dos	2	2020-05-26		Behandlingen avslutad.
Erytrocyter - SAGMAN	200 ml engångsdos	2	2020-05-26		Behandlingen avslutad.
Erytrocyter - SAGMAN	200 ml engångsdos	2	2020-05-26		Behandlingen avslutad.

Om man t ex har satt 8 timmar som sluttid kommer den att ha en vit bakgrund i 8 timmar, därefter en grå streckad bakgrund i 24 timmar innan den flyttar ner till avslutade läkemedelsbehandlingar. Den går alltså att administrera en gång under 32 timmar.

Bakgrund:

När man ordinerar engångsdos med hjälp av kortnotation end eller i1dos blir det en streckad bakgrund **direkt** på produktens namn och dosering, texten "Behandlingen avslutad" visas på grå bakgrund och i tooltip visas samma tid för utsättning som starttiden Detta har misstolkats som att man inte ska administrera detta till patienten.

Dosering: ml 200end ?

Start: Datum och tid 2020-05-26 14:01

Slut: Efter 1 utdelningstillfällen

Dosering: ml 200x1i1dos ?

Start: Datum och tid 2020-05-27 08:00

Slut: Efter 1 utdelningstillfällen

Aktuella läkemedelsbehandlingar [2]							
	Erytrocyter - SAGMAN	200 ml x 1 i1dos	Σ	🕒	2020-05-26		Behandlingen avslutad.
	Erytrocyter - SAGMAN	200 ml engångsdos	Σ	🕒	2020-05-26		Behandlingen avslutad.

Mallar för engångsdos:

Alla mallar för engångsdos kommer att byggas om successivt och få en sluttid efter 12 timmar. De kommer då att kunna administreras en gång under följande 36 timmar.