

Rutiner vid vaccination - vårdhygieniska rekommendationer

För att förhindra att personal smittar patient

Grundläggande för att förhindra att personal smittar patienter är god följsamhet till basala hygienrutiner. Håll avstånd där så är möjligt.

- Personal använder visir och/eller munskydd för att skydda patient sk source control enligt gällande rutin.
- Handdesinfektion före och efter patientkontakt, samt före förberedelse av läkemedel.
- Händerna spritas före och efter användning av handskar.

Stickskydd för personal

Enligt rekommendation från Arbetsmiljöverket används handskar vid vaccination. Vinylhandskar fungerar för ändamålet.

Arbetstagare ska få utbildning i hur man arbetar på ett sticksäkert sätt och hur man hanterar kanyler med skyddsfunktion. Alla vassa föremål ska vara försedda med en integrerad skyddsfunktion om det finns tillgängligt på marknaden.

Arbetsgivarens rutin för åtgärder vid sticksador ska vara känd.

<http://dokpub.regionkronoberg.se/OpenDoc.aspx?Id=41612> för region Kronoberg eller respektive kommuns/arbetsgivares rutin.

- Efter användning läggs genast vassa föremål i en behållare avsedd för stickande/skärande avfall. Behållaren ska finnas nära.
- Skyddshylsan ska aldrig sättas tillbaka på en använd kanyl.

Se AFS 2018:4 Smittrisker

Huddesinfektion

Huddesinfektion är inte nödvändig för vaccinationer som ges subkutant, intrakutant eller intramuskulärt till friska personer.

Om huddesinfektion behövs vid smutsig hud eller gravt nedsatt immunförsvar används klorhexidinsprit och utförs på följande sätt: Gnid med ordentligt genomblöt tork eller kompress under minst 5 sekunder och låt därefter lufttorka. För att alkoholen skall hinna verka ska huden därefter vara fuktig under minst 30 sekunder. Vid allergi mot klorhexidin kan ett alkoholbaserat medel avsett för handdesinfektion användas. <https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/vardhygien/huddesinfektion/ingrepp-med-liten-risk-for-infektion/>