

Rutin vid ESBL-bildande bakterier

Information Vid nypupptäckt ESBL har behandlande läkare ansvar för att informera patienten. Det finns smittskyddsblad för både läkare och patient.

Journalanteckning

Behandlande läkare har ansvar för att bärarskapet anges i journalen (journalanteckning).

Märkning

Märkning i Cambio Cosmic kan övervägas om bärarskapet bedöms utgöra en risk för smittspridning i vården (framför allt vid riskfaktorer). Märkning görs av behandlande läkare under uppmärksamhetssymbol.

Riskfaktorer för smittspridning

Riskfaktorer för smittspridning kan variera för olika patienter och situationer men är störst vid: -diarré -urin-och fecesinkontinens -KAD, RIK, stomier, dränage (framför allt bukdränage) -vätskande sår

Vid speciellt spridningsbenägna stammar kan vårdhygien meddela behandlande läkare att journalen bör märkas.

Vid nypupptäckt ESBL-bildande bakterie hos patient som tillfälligt vårdas på enhet är det viktigt att ordinarie vårdgivare informeras.

En grund för att förhindra smittspridning är att basala vårdhygieniska rutiner alltid fungerar. För vårdhygieniska rutiner se Vårdhandboken –multiresistenta bakterier.

Vid ESBL_{CARBA} skall journalen alltid märkas (liksom tidigare).

Utarbetad i samarbete med vårdhygien

smittskyddsenheten

Centrallasarettet, 351 85 Växjö. ☎0470-588278