

Behandlingsalgoritm HFrEF/HFmrEF

Påbörja basbehandling så snabbt som möjligt med alla de fyra läkemedelsgrupperna som minskar dödlighet. Gärna under vårdtiden men senast inom 2-4 veckor.

ISCHEMISK HJÄRT- SJUKDOM	UTTALAD STAS	NEDSATT NJUR- FUNKTION	HYPO- TENSION	HYPER- TENSION	FLIMMER (NORMO- FREKVENT)	HÖG FREKVEN- S (OAVSETT RYTM)
BÖRJA MED						
HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR						
BB + SGLT2h	SGLT2h + ACEh/ARB	SGLT2h+BB	SGLT2h	ACEh/ARB + BB	SGLT2h + ACEh/ARB	BB + SGLT2h
SNART DÄREFTER TILLÄGG AV						
ACEh/ARB + MRA	BB + MRA	ACEh/ARB	BB + ACEh/ARB + MRA	SGLT2h + MRA	BB + MRA	ACEh/ARB + MRA
Intravenöst järn (vid järnbrist)						
VID FORTSATT SYMTOMATISK HJÄRTSVIKT						
ACEh/ARB bytes till ARNI						
Diuretika vid ödem/stas						