

Upphandlade diabeteshjälmedel - Öppen vård					
Upphandling 2020-08-01- 2023-07-31					
	Förpackning (antal)	Styckpris (exkl. apotekets distrkostnad)	Mät- område (mmol/l)	Hållbarhet	
Basmätare (Bron) med glukosmätfunktion inkl glukossticka					
Ascensia					
Contour startkit (mätaren) beställs via mail diabetes@ascensia.com eller telefon 020-830084					
Contour teststicka	vnr.202090	50	1,05 kr	0,6-33,3	24 mån från tillverkning.
Basmätare med glukos- och ketonmätfunktion inkl glukos- resp. ketonsticka Abbott S.					
FreeStyle Precision Neo/startkit					
Freestyle Precision glukossticka	vnr.200191	100	1,55 kr	1,1-27,8	18 mån f tillv
Freestyle Precision beta-keton-sticka	vnr.204519	10	11,00 kr	0,0-8,0	18 mån från tillverkning
Avancerad mätare (Silver) med glukosmätfunktion inkl glukossticka					
ContourXT system för blodsockerkontroll/startkit					
Contour Next teststicka	vnr. 732781	50	1,69 kr	0,6-33,3	24 mån från tillverkning
Sensorbaserad glucosmätare, FGM Abbott Scandinavia					
FreeStyle 1 Libre startkit (mätare,sensorer)			790 kr		
FreeStyle 1 Libre sensor			420 kr		
FreeStyle 2 Libre startkit (mätare,sensorer)			790 kr		
FreeStyle 2 Libre sensor			436 kr		
Freestyle Precision glukossticka	vnr. 200191		1,55 kr	1,1-27,8	18 mån f tillv
Freestyle Precision beta-keton-sticka	vnr. 204519	10	11,00 kr	0,0-8,0	18 mån från tillverkning
Pennkanyl till insulinpenna KaroPharma					
Insupen 4,6,8 mm vnr. 732560, 205601, 205602		100	0,26kr	-	-
Lancetter till flergångsprovtagare Medtrust					
Wellion Lancets 28G		vnr.733524	200	0,10 kr	
<p>Hjälmedel förskrivs på hjälpmedelskort Cosmic. Utlämning av hjälpmedel sker på apotek. Angivet pris är exklusive apotekets arvode</p> <p>Blodketonstickor används till patienter med ökad risk för hastig ketoacidosis utveckling särskilt barn och patienter med insulinpump.</p> <p>Plasmaglukosmätare för egenkontroll ger mindre exakta värden än våtkemisk metod och HemoCue. Det har dock sällan någon klinisk betydelse. Plasmaglukosmätare för egenkontroll bör kontrolleras mot HemoCue.</p> <p>Kommunal hemsjukvård rekvirera mätare och teststickor som läkemedelsnära förbrukningsartiklar från region Kronobergs förråd. Kontrollösning beställs från företaget. Hållbar 3månader i öppen förpackning. Stickskyddad pennkanyl BD AutoShield Duo 5mm vnr 329605, 8mm vnr. 329608 rekvireras som läkemedelsnära produkt. Användare instruktion se länk https://www.youtube.com/watch?v=XoqdlPzZbhc</p>					

Personer med synskada med behov av talande blodsockermätare kan använda:

Wellion Calla dialog https://www.wellion.se/sv/Produkter/Blodsockermaetare/wellion_calla_dialog/
Talande instruktion https://www.wellion.se/sv/service/Nedladdningar/talad_instruktion/

AccuChek mobile (ger lika många signaler som blodsockernivå)
FreeStyle Libre - avläsning med smartphone och uppläsningfunktion

Flergångsprovtagare ingår i startkit, den är patientbunden och får endast användas vid egenvård dvs av patienten själv eller närstående.

Engångsprovtagare i första hand kontaktutlöst lansett. Förråd **Vitrex Press II** (gul), best nr 19719. Hjälpmedelskort Medlance K, lila vnr. 204625.

Utlåning av blodsockermätare - mätare med stickor (ej kassett) kan lånas ut. Förpackning med stickor rekvideras via Ebuilder. Bra pedagogiskt hjälpmedel t.ex. nyupptäckt diabetes och vid viss läkemedelsbehandling t.ex. cortison.

Rekommendation för blodsockerkontroll enligt Nationella riktlinjer för diabetesvård 2017

Systematisk mätning - Typ1 och typ2 diabetes med insulin (prio 1), typ2 diabetes med kost och tablettbehandling (prio 8)

Riktad mätning - Typ2 diabetes (prio 3) pedagogiskt verktyg för att få egen kunskap om hur sjukdom, mat, aktivitet och läkemedel påverkar blodsockret.

”Uppmana personen att känna efter hur det känns i kroppen, uppskatta aktuellt blodsocker före provtagning, verifiera med blodsockerkontroll. Ett sätt att lära hur blodsockernivån känns i kroppen”.

När skall blodsocker kontrolleras?	<ul style="list-style-type: none">• Vid misstanke på högt och lågt blodsocker• Vid val av insulindos• För att lära och förstå effekten av måltider, motion och behandling• För kontroll/uppföljning av behandling												
Hur skall blodsocker kontrolleras?	<ul style="list-style-type: none">• Handtvätt före provtagning. Rätt provtagningsteknik se länk http://vardhandboken.se/Kategori/Provtagning_och_unders%c3%b6kning• Rätt förvaring och handhavande av provtagningsmaterial												
Lathund för förskrivning	<table border="1"><tr><td>1-2 gånger/vecka</td><td>50 stickor</td><td>1 förpackning 2 ggr/år</td></tr><tr><td>4 gånger/vecka</td><td>50 stickor</td><td>1 förpackning 4 ggr/år</td></tr><tr><td>1 gång/dag</td><td>50 stickor</td><td>2 förpackningar 4 ggr/år</td></tr><tr><td>5 gånger/dag</td><td>50 stickor</td><td>9 förpackningar 4 ggr/år</td></tr></table>	1-2 gånger/vecka	50 stickor	1 förpackning 2 ggr/år	4 gånger/vecka	50 stickor	1 förpackning 4 ggr/år	1 gång/dag	50 stickor	2 förpackningar 4 ggr/år	5 gånger/dag	50 stickor	9 förpackningar 4 ggr/år
1-2 gånger/vecka	50 stickor	1 förpackning 2 ggr/år											
4 gånger/vecka	50 stickor	1 förpackning 4 ggr/år											
1 gång/dag	50 stickor	2 förpackningar 4 ggr/år											
5 gånger/dag	50 stickor	9 förpackningar 4 ggr/år											