

Handläggning vid positivt klamydiaprov i Region Kronoberg

1. Ge patienten information om klamydia, inklusive hur det smittar och behandlas. Sätt in behandling och vidimera eventuellt provsvar i Cambio Cosmic.
Observera att patienten har rätt att söka för behandling på annan enhet än där provet tagits. Detta gäller även när provtagning beställts på nätet, tex. via Vårdguiden 1177 eller test köpt på apotek. I dessa fall är det viktigt att säkerställa att provet var positivt, tex. genom att patienten visar provsvar eller motsvarande handling.
2. Behandlande vårdgivare behandlar även eventuell fast partner (samtidigt) efter klamydiaprovtagning. (Blir partnern positiv ska även hen remitteras till central smittspårningsenhet på separat remiss).
Behandlingsrekommendation Doxyferm® (doxycyklin)
3. Smittspårningen utförs av centrala smittspårningsenheten. Detta sker efter remiss.

Remissen hittas i Cambio Cosmic

Remiss: Skicka remiss

Remisstyp: Ändra till konsultationsremiss

Välj enhet: Centrala smittspårningsenheten

Pappersremiss: Endast för de som ej har Cambio Cosmic. Skickas till
Sesam, Centrala smittspårningsenheten, N Esplanaden 35, 352 31, Växjö

Pappersremissen ska innehålla:

- Aktuellt telefonnummer till patienten
- Indikation för provtagning samt provtagningsdatum
- Eventuella symtom
- Diagnosdatum
- Datum för insatt behandling samt vilken behandling
- Uppgift om eventuell fast partner och om vederbörande är provtagen och behandlad

När smittspårning remitteras till centrala smittspårningsenheten gör de den kliniska anmälan i Sminet.

4. Informera patienten att personal från centrala smittspårningsenheten kommer att ta kontakt inom 1-2 veckor. **Viktigt att kontrollera att telefonnumret är aktuellt!**

Kontrollprov: Det finns ingen känd resistensutveckling för klamydia. Har patienten följt sin ordination behövs därför inget kontrollprov. Om man behöver ta ett kontrollprov bör man vänta **8 veckor** efter behandling. Tidigare prov ger ett osäkert resultat (om positivt).