



Riskfaktorer för död hos 1247 kvinnor 70 till 100-år i studie för att förebygga höftfrakturer i Kronobergs och Kalmar län 2002-2021

Lisa Alvunger, läkarstuderande Kalmar/Linköping; Anna Segernäs, distriktsläkare, med.dr, Linköpings universitet; Anna Lindgren, statistiker, fil.dr, Lunds universitet; Robert Eggertsen, distriktsläkare, seniorprofessor, Göteborgs universitet; Pär Wanby, överläkare, docent Linköpings universitet; Hans Thulesius, distriktsläkare, professor, Linnéuniversitet; Daniel Albertsson, distriktsläkare, med dr, FoU Kronoberg

Syfte

Att undersöka samband mellan riskfaktorer för död 20 år efter jämförande kontrollerad intervention för att förebygga höftfrakturer hos 1247 kvinnor 70-100 år gamla vid studiestart 2002.

Metod

Samband mellan 11 riskfaktorer för död och deltagande i interventions eller kontrollgrupp studerades med proportionella Cox regressions-risk-modeller.

Betydelse

Dålig självskattad hälsa och oförmåga att resa sig fem gånger från stol utan att använda armar kunde signifikant förutsäga dödlighet. I interventionsgruppen sågs minskad dödlighet bara för kvinnor som kunde resa sig fem gånger från stol utan att använda armar där samband är oklart med interventionen som innebar träning, fallriskreduktion och skelettstärkande medicin.

Tidsplan

Publicering av vetenskapligt manuskript 2023.