

Arbetsrutin för dokumentation gällande IVP för sårbehandling.

Primärvård

Individuell vårdplan (IVP) lokal sårbehandling upprättas på alla sår som kräver mer än två uppföljande besök och svårläkta sår, däribland trycksår. Sår ska, i dessa fall, inte dokumenteras i kronologisk journal, epikris eller rapportblad. Såret och den lokala sårbehandlingen dokumenteras i IVP lokal sårbehandling och en kort besöksanteckning skrivs i den kronologiska journalen med hänvisning till IVP (gäller mottagning och vårdcentral). Diagnos (fast val) väljs i IVP lokal sårbehandling om orsaken till såret är fastlagd, diagnosen kan läggas till vid ett senare tillfälle. Diagnosen kodas i den korta besöksanteckningen i kronologisk journal. Om patienten har flera sår, dokumenteras de under samma vårdåtagande - "Vårdplan Sårbehandling" men med en IVP för varje sår. Om det finns flera sår på samma extremitet som behandlas lika, kan man använda samma IVP för samtliga dessa sår. Både distriktssköterska, sjuksköterska och undersköterska kan upprätta en individuell vårdplan.

Vid svårläkta sår upprättas vid det "utvidgade besöket" en anteckning i sårvårdsmall (kronologiska journalen) och en IVP lokal sårbehandling. I sårvårdsmallen journalförs riskfaktorer och undersökningar som gjorts och passande diagnoskod om etiologisk diagnoskod inte är fastställd. I IVP lokal sårbehandling journalförs sårstatus och insatta åtgärder (lokal sårbehandling). Vid uppföljande besök sker dokumentationen endast i IVP lokal sårbehandling men med en kort hänvisning till IVP i kronologisk journal som en besöksanteckning (sårvårdsmall). När etiologisk diagnos är fastställd, kodas denna i besöksanteckningen (sårvårdsmall) som hänvisar till IVP. Vid kompressionsbehandling kodas (KVÅ kod) även denna vid besöksanteckningen. Vid kraftig försämring av såret eller status på patienten görs en ny sårvårdsmall och en uppdatering av IVP lokal sårbehandling.

Foto tas vid första besöket och sedan minst 1gång per månad. Foto bifogas till utförd åtgärd sår (under rubrik lokalisering) i IVP lokal sårbehandling.

När såret är läkt avslutas IVP lokal sårbehandling men inte vårdåtagandet. De olika målen utvärderas innan IVP avslutas.

Slutenvård

Ta reda på vilka sår patienten har vid inskrivning och om det redan finns en påbörjad "IVP lokal sårbehandling". Dokumentationen sker i befintlig individuell vårdplan. Om det inte finns, starta en ny "IVP lokal sårbehandling". Både sjuksköterska och undersköterska kan upprätta en individuell vårdplan.

Om patienten skrivs ut till kommunal hälso- och sjukvård avslutas IVP lokal sårbehandling även om såret inte är läkt. Hänvisning till den avslutade IVP lokal sårbehandling görs i epikrisen.

Region och kommun

Det är inte tillåtet att dokumentera i varandras journaler över huvudmannagränser, men Cosmic är nu öppnat så att samtliga kommuner kan läsa i regionens vårdplaner. I epikris ska man alltså hänvisa till "Vårdplan Sårbehandling."

För att få ta del av kommunernas vårdplaner ser det lite olika ut i länet. Man kan läsa kommunernas vårdplaner eller efterfråga sårbehandlingsinformation via Link.