

Överenskommelse om rutin och kostnadsfördelning gällande sårbehandling med negativt tryck NPWT=Negative Pressure Wound Therapy

Inledning

Sårbehandling med negativt tryck NPWT är en metod som syftar till snabbare läkning av operationssår och sår som av någon anledning inte läker av sig självt. Vid behandling med negativt tryck främjas sårläkningen främst genom att infektiöst material och exsudat avlägsnas, ödem minskas och granulation från djupet stimuleras.

Sårbehandling med negativt tryck är ett mycket gott tillskott i behandlingsarsenalen, men ska användas på rätt sätt till rätt patient. Se riktlinje för sårbehandling med negativt tryck.

Rutin och kostnadsfördelning

Sårbehandling med negativt tryck ordinerar av läkare. Behandlingen ska följas upp av ordinator efter två veckor. Om ordinatören då bedömer att behandlingen inte har gett förväntat resultat kan behandlingen avbrytas. Vid fortsatt behandling ska ny uppföljning göras efter två veckor eller efter särskild överenskommelse med patientansvarig sjuksköterska.

Ordinatören står för hyra av pump under hela behandlingstiden samt för omläggingsmaterial, kanstrar, slangar, kopplingar i fem arbetsdagar. Därefter står den huvudman som ansvarar för omläggningarna för kostnad av förband och tillbehör.

Vi behandling med så kallad engångspump står ordinatören för omläggningspaketet det vill säga pump, batterier och förband, vid behandlingstillfället i slutenvård eller på vårdcentral. Samt för material för de följande fem arbetsdagarna. Ett omläggningspaket innehåller en pump och två förband. Därefter står den huvudman som ansvarar för omläggningarna för kostnad av förband under den tid som patienten behandlas där.

Om ordinatören vid uppföljningen av sårbehandling fortsatt ordinerar behandlingen står ordinatören för det omläggningsförband som behövs vid omläggningstillfället.