



## Subtotal kolecystektomi – kort- och långtidssjuklighet samt hälsoekonomi ur ett rikstäckande perspektiv

Arvid Gustafsson<sup>a, b</sup> Adam Zeyara<sup>b</sup>, Greger Olsson<sup>a</sup>,  
Bobby Tingstedt<sup>b</sup>

<sup>a</sup>Kirurgkliniken och Institutionen för forskning och utveckling, Centrallasarettet, Region Kronoberg, Växjö

<sup>b</sup>Institutionen för kliniska vetenskaper, Kirurgi, Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus, Lund.

### Syfte

Att studera kort och långtidssjukligheter av operation med delvis borttagande av gallblåsan och dess olika beskrivna tekniker.

### Metod

Retrospektiv register- och journalbaserad studie med datauttag via GallRiks samt journalutdrag från alla i GallRiks registrerade sjukhus (alla sjukhus i Sverige).

### Betydelse

Vid operation av gallblåsan tas normalt hela gallblåsan bort. Delvis borttagande av gallblåsan (subtotal kolecystektomi) är en beskriven metod som kan användas när operationsförfarandet anses för ”svårt” och riskerna med att fortsätta med komplett borttagande för höga. Tidigare gjordes i dessa fall en konvertering från titthål till öppen operation. Denna metod innebär att operationen kan fortskrida med titthålsteknik och dess fördelar.

### Tidsplan

Datainsamling pågår (nov 2021) och beräknas vara klart 2021. Materialet beräknas vara färdigt för publikation under 2022.