



En beskrivande studie av hur leg. sjuksköterskor använder den svenska triage skalan RETTS[©]

Sara Wireklint, leg. sjuksköterska, akutmottagningen Växjö, doktorand Linnéuniversitetet; Carina Elmqvist, docent FoU Kronoberg & Linnéuniversitetet; Katarina Göransson, docent, Högskolan Dalarna, Falun & KI, Stockholm

Syfte

Att fastställa tillförlitligheten i användandet av den svenska triageskalan RETTS[©], på två svenska akutmottagningar.

Metod

28 sjuksköterskor triagerade samma 46 skrivna, autentiska, aidentifierade patientfall, med en för dem välkänd version av RETTS[©]. Resultat analyserades med beskrivande statistik och oviktad kappa.

Betydelse

RETTS[©] har en tydlig gräns för instabil patient (livshot) och stabil (icke livshot). Det var samstämmighet i 15 % av fallen, dvs. alla sjuksköterskor triagerade likadant i sju av 46 fall. I 46 % (21 fall) fanns en spridning över gränsen instabil/stabil. Kappavärdet var 0,562 (måttlig samstämmighet), varför det är rimligt att ifrågasätta skalans förmåga att särskilja instabil patient från stabil.

Tidsplan

Publicerad artikel i International Emergency Nursing, 2018.