

Användarstöd - MADRS- S Självsfattning vid depression

Användningsområde

Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale -Självsfattning: MADRS-S är en självsfattningsskala för depression. MADRS-S består av nio frågor som motsvaras av symtomen (1) Sinnesstämning, (2) Oroskänslor, (3) Sömn, (4) Matlust, (5) Koncentrationsförmåga, (6) Initiativförmåga, (7) Känslomässigt engagemang, (8) Pessimism samt (9) Livslust. Varje symptom skattas enligt en sjugradig skala med fyra definierade och tre mellanliggande, icke-definierade, skalsteg.

När används formuläret?

Vid misstanke om depressivt syndrom. Formuläret kan också användas till att utvärdera behandlingseffekter och för att följa ett förlopp över tid.

En screening måste alltid kompletteras med klinisk bedömning.

Suicidrisk

Suicidrisk måste alltid bedömas vid kontakt med vården. Formuläret ersätter **INTE** den bedömningen. När suicidrisk misstänks följs sedvanliga rutiner.

Vem administrerar formuläret?

Ansvarig behandlare administrerar formuläret till patienten och ansvarar för tolkning av resultaten och anteckning i journalen.

Svenska rättigheter

Marie Åsberg & Pär Svanborg äger rättigheterna till den svenska versionen. Det är godkänt av rättighetshållarna att använda MADRS-S svensk version fritt i non-profit sammanhang; kliniska, vetenskapliga samt i utbildning.

Tidsintervall

De senaste tre dyggen.

Administrationstid

5-10 minuter.

Tolkning av MADRS-S vid screening för depressivt syndrom

Svenska normer:

0-12 poäng väsentligen obesvärat

13-19 poäng mild depression

20-34 poäng måttlig depression

>34 poäng svår depression (Svanborg & Ekselius, 2003)

Fakta hämtad från F-banken.se.

Referenser:

Montgomery, S., Åsberg, M., Jörnstedt, L., Thorén, P., Träskman, L., & McAuley, R. et al. (1978). Reliability of the CPRS between the disciplines of psychiatry, general practice, nursing and psychology in depressed patients. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 57(S271), 29-32.

Svanborg, P., & Ekselius, L. (2003). Self-assessment of DSM-IV criteria for major depression in psychiatric out- and inpatients *. *Nordic Journal Of Psychiatry*, 57(4), 291-296

